Muan
Web Contents

2026년 10월 07일 22시 52분

목차

목차 2

구제역 방역 3

구제역 방역 3

구제역이란? 3

농가 실천사항 3

구제역 예방접종 프로그램 3

임상증상 3

소독요령 4

예찰요령 4

구제역 방역

"올바른 백신접종과 소독실시로 구제역을 예방할 수 있습니다."

구제역이란?

소, 돼지, 양, 염소 및 사슴 등 발굽이 둘로 갈라진 동물(우제류)에 감염되는 질병으로 전염성이 매우 강하며 입술, 혀, 잇몸, 코 또는 지간부 등에 물집(수포)이 생기며 체온이 급격히 상승되고 식욕이 저하되어 심하게 앓거나 어린 개체의 경우 폐사가 나타나는 질병임. 세계동물보건기구(OIE)에서 지정한 중요 가축 전염병으로 가축전염병예방법 제1종 가축전염병에 속함.

농가 실천사항

- 농장 출입금지 표지판 설치 및 차량 통제
- 농장 출입 차량 전 · 후 소독 실시
- 축사 내 · 외부 소독 및 정기적인 구서작업 실시
- 농장 출입 시 방역복, 장화 착용 후 출입
- 구제역 발생국 여행자제 및 해외여행 후 최소 5일간 농장 출입 금지
- 돼지를 구매한 소유자는 『돼지이동 승인 임상검사 증명서』를 확인 후 1년간 보관
- 외국인 근로자 고용시 시 · 군에 신고 및 차단방역 교육 실시
- 백신접종 프로그램을 준수하고 백신은 근육 안에 정확하게 주입한다.

* 백신은 냉장(2~8℃)보관, 겨울철은 따뜻하게(20℃ 이하) 하여 접종

구제역 예방접종 프로그램

축종	백신접종시기	축종	백신접종시기
소	▪ 송아지 : 2개월령 1차, 1개월 후 2차 접종 ▪ 모든 소 : 4~7개월 간격으로 접종	흑돼지 멧돼지	▪ 생후 2~3개월령 1차, 1차 접종 후 4~7개월 간격으로 접종
돼지	▪ 모돈 : 분만 약 1개월(3~4주) 이전 접종 ▪ 웅돈 : 4~7개월 간격으로 접종 ▪ 자돈 : 2~3개월령 1차 접종(다만, 긴급 백신접종지역에서는 2주 후 추가 보강접종) ▪ 종돈장의 자돈 중 암컷(후보모돈 예정) 2개월령 1차, 1개월후 2차 접종	염소	▪ 어린염소 : 2개월령 1차, 1개월 후 2차, 2차 접종 4~7개월 후 보강 ▪ 1세 이상 염소 : 1년 간격으로 접종
		사슴	▪ 어린사슴 : 2개월령 1차, 1개월 후 2차 접종 ▪ 모든사슴 : 4~7개월 간격으로 접종

임상증상

▪ 소 : 거품성인 침흘림, 콧구멍 주변의 궤양, 유두 수포, 발굽사이 수포형성 및 궤양 · 가피, 잇몸주변, 혀 궤양

- 돼지 : 콧등, 유방 수포 및 상피 탈락, 혀 궤양, 발굽사이 수포

소독요령

- 허가된 소독약을 사용하고 권장 유효 희석 배수 준수
- 소독약 혼합사용 금지 : 중화되어 소독의 효과가 없어짐
- 생석회는 습기나 물에 접촉시 높은 열이 발생되므로 화상에 주의할 것

예찰요령

- 거품섞인 침흘림과 혀와 잇몸 등에 물집(수포)이 있습니까?
- 발굽사이와 유두 등에 물집(수포)이 있습니까?
- 입주변에 물집이 있거나 콧잔등에 큰물집이나 터진 흔적이 있습니까?
- 발굽의 고통으로 서거나 걷지 못하고 절룩거리지 않습니까?

의심증상 발견시 즉시 가축방역기관에서 신고 1588-4060 / 1588-9060

COPYRIGHT ⓒ MUAN-GUN. ALL RIGHTS RESERVED.

MUAN

Web Contents

무안군